

Бурмей Світлана Андріївна,
аспірант, старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID ID: 0000-0002-8157-4262
м. Ужгород, Україна

Бойко Надія Володимирівна,
доктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID ID: 0000-0002-2467-7513
м. Ужгород, Україна

Персоніфікований підхід у лікуванні синдрому подразненого кишечника: перспективи використання фармабіотиків

Вступ. Синдром подразненого кишечника (СПК) є поширеним гастроентерологічним розладом, що супроводжується хронічними функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту, зокрема болем у животі, здуттям, діареєю або закрепами. Традиційні методи лікування, такі як дієта, регуляція моторики кишечника медикаментами чи застосування антидепресантів, не завжди виявляються ефективними. У зв'язку з цим зростає інтерес до корекції симптомів СПК шляхом впливу на мікробіом кишечника за допомогою пробіотиків – живих мікроорганізмів, що сприяють відновленню балансу кишкової мікробіоти.

Метою дослідження було визначити ефективність використання фармабіотиків для полегшення симптомів СПК та підвищення якості життя пацієнтів шляхом відновлення балансу кишкової мікробіоти.

Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження були випорожнення кишечника від пацієнтів із синдромом подразненого кишечника. Мікробіологічне дослідження здійснювали шляхом кількісного посіву біоматеріалу на поживні середовища з подальшою ідентифікацією виділених мікроорганізмів. Для підтвердження та уточнення результатів використовували метод мас-спектрометрії MALDI-TOF. Персоніфікований підбір фармабіотиків базувався на основі визначення антагонізму між ізольованими із біоматеріалу мікроорганізмами та фармабіотиками.

Результати та обговорення. У дослідженні виявлено, що найпоширенішим підтипом СПК є діарейний (СПК-Д), який діагностували у 61% пацієнтів. Хвороба частіше зустрічається у жінок, а середній вік пацієнтів варіює залежно від підтипу СПК, причому для змішаного типу (СПК-Зм) характерна тенденція до старшого віку. Також встановлено суттєві відмінності у домінуванні мікроорганізмів у кишкової мікробіоті залежно від підтипу СПК.

Висновки. Результати дослідження демонструють важливість індивідуального підходу до корекції кишкової мікробіоти. При СПК-З ефективною є композиція фармабіотиків *Lactobacillus bulgaricus* S6 і *L. rhamnosus* S25, для СПК-Д – *L. bulgaricus* A6 і *L. bulgaricus* S6, а для СПК-Зм – *L. bulgaricus* A22 і *L. rhamnosus* S25. Застосування фармабіотиків може суттєво зменшити симптоми СПК та покращити якість життя пацієнтів.

Ключові слова: діагностика, кишкова мікробіота, синдром подразненого кишечника, фармабіотики, лактобактерії, персоніфікований підхід.

Burmei Svitlana Andriivna, Postgraduate Student, Senior Lecturer at the Department of Medical and Biological Disciplines, Uzhhorod National University, ORCID ID: 0000-0002-8157-4262, Uzhhorod, Ukraine

Boiko Nadiya Volodymyrivna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Medical and Biological Disciplines, Uzhhorod National University, ORCID ID: 0000-0002-2467-7513, Uzhhorod, Ukraine

Personalized approach in the treatment of irritable bowel syndrome: prospects for the use of pharmabiotics

Introduction. Irritable bowel syndrome (IBS) is a common gastroenterological disease characterized by chronic functional disorders of the gastrointestinal tract, including abdominal pain, bloating, diarrhea, or constipation. Traditional treatment methods, such as dietary modification, drug regulation of intestinal peristalsis, or antidepressants, are not always effective. Therefore, there is growing interest in alleviating IBS symptoms by influencing the gut microbiome with probiotics – live microorganisms that help restore the balance of the gut microbiota. This study aimed to determine the effectiveness of pharmabiotics in alleviating IBS symptoms and improving patients' quality of life by restoring the balance of the gut microbiota.

Materials and methods. The study material was stool samples from patients with irritable bowel syndrome. Microbiological analysis was performed using quantitative methods of culture on nutrient media, with the subsequent identification of isolated microorganisms. The MALDI-TOF mass spectrometry method was used to confirm and clarify the results. Individual selection of pharmaceutical preparations was based on the determination of antagonism between microorganisms isolated from the biomaterial and pharmabiotics.

Results and discussion. The study showed that the most common subtype of IBS is the diarrhea-predominant type (IBS-D), diagnosed in 61% of patients. The disease was more common in women, and the average age of patients varied depending on the subtype of IBS, with a tendency towards an older age group in mixed-type IBS (IBS-M). Significant differences in the dominance of microorganisms in the gut microbiota were also found depending on the subtype of IBS.

Conclusions. The results of the study emphasize the importance of an individual approach to the correction of the gut microbiota. For IBS-C, an effective pharmabiotic composition *Lactobacillus bulgaricus* S6 and *L. rhamnosus* S25; for IBS-D – *L. bulgaricus* A6 and *L. bulgaricus* S6; and for IBS-M – *L. bulgaricus* A22 and *L. rhamnosus* S25. The use of pharmabiotics can significantly reduce IBS symptoms and improve patients' quality of life.

Key words: diagnostics, gut microbiota, irritable bowel syndrome, pharmabiotics, lactobacilli, personalized approach.

Вступ. Синдром подразненого кишечника (СПК) є одним з найпоширеніших гастроентерологічних захворювань, яке характеризується хронічними порушеннями функцій шлунково-кишкового тракту (ШКТ), зокрема боєм у животі, здуттям, діареєю чи закрепами [1, 2]. Попри його широку розповсюдженість та суттєвий вплив на якість життя пацієнтів, точні причини виникнення СПК досі залишаються предметом наукових дискусій. Сучасні дослідження в галузі мікробіології та медицини надають все більше доказів важливості кишкового мікробіому для здоров'я людини. Мікробіота кишечника є невід'ємною складовою метаболічних процесів: засвоєння поживних речовин, продукування енергії, а також різних обмінних процесів, таких як утворення вторинних жовчних кислот, перетворення холіну, забезпечення продукції вітамінів, жирних кислот і амінокислот, абсорбції важливих мікроелементів, бродіння та поглинання неперетравлених вуглеводів тощо [3, 4]. Розуміння взаємодії між мікроорганізмами кишечника та їхнім впливом на імунну систему, обмін речовин та багато інших аспектів стає ключовим аспектом для розробки нових стратегій лікування та профілактики різних захворювань, в тому числі і СПК.

У здорових людей баланс між корисними та умовно-патогенними мікроорганізмами підтримується за допомогою природних механізмів організму [4, 5]. У пацієнтів із СПК, на відміну від здорових, спостерігається дисбіоз – зміна складу та функцій мікробіому, що може призводити до порушення роботи кишечника. Встановлення взаємозв'язку між дисбіозом (дисбалансом мікробіому) та СПК відкрило нові можливості для терапії цього захворювання. Науковці [3] виявили, що у людей зі СПК зменшується кількість бактерій родів *Lactobacillus* та *Bifidobacterium*, які виконують захисну роль, а натомість збільшується кількість умовно-патогенних мікроорганізмів, таких як *Escherichia coli* lac- та *Clostridium*. Дисбіоз може викликати запалення слизової оболонки, підвищення чутливості нервових закінчень у кишечнику, а також порушення роботи «бар'єра» між кишечником і кровоносною системою, що сприяє хронізації симптомів.

Відповідно до діагностичних Римських критеріїв IV, СПК класифікується на чотири підтипи на основі переважної моделі випорожнень: СПК із закрепом (СПК-З), СПК із діареєю (СПК-Д), змішаний СПК із закрепами та діареєю (СПК-Зм) і неklasифікований синдром подразненого кишечника [1, 2].

Традиційні підходи, такі як дієта, медикаменти для регуляції моторики кишечника чи антидепресанти, не завжди ефективні. Тому інтерес дослідників все частіше спрямовується на терапевтичну корекцію мікробіому, зокрема за допомогою пробіотиків – живих

мікроорганізмів, що здатні покращувати стан кишкової мікробіоти [7, 8]. Пробіотики мають унікальну властивість впливати на баланс мікробіоти кишечника через пригнічування росту умовно-патогенних мікроорганізмів, відновлюючи «здоровий» склад мікробіоти. Крім того, вони зміцнюють клітинні з'єднання епітелію, знижуючи проникність кишечника, знижують рівень прозапальних цитокінів, які викликають дискомфорт і біль, а також впливають на вісь "кишечник-мозок", знижуючи підвищену чутливість нервових закінчень, яка часто спостерігається при СПК [9].

Сучасні клінічні дослідження демонструють, що використання пробіотиків може зменшувати вираженість симптомів СПК, таких як біль, здуття та порушення дефекації, а також сприяти покращенню якості життя пацієнтів [10]. Наприклад, пробіотики з *Bifidobacterium infantis* та *Lactobacillus plantarum* продемонстрували ефективність у зменшенні запалення та нормалізації моторики кишечника [11]. Саме тому мікробіом розглядається не лише як важливий елемент патогенезу СПК, а й як перспективна мішень для терапевтичного впливу [12].

Однак, вибір пробіотиків має бути індивідуальним, адже їхній ефект залежить від конкретного штаму мікроорганізму, дози та тривалості прийому. Додатково варто враховувати особливості клінічного перебігу СПК у пацієнта. Все більше даних акцентують свою увагу саме на важливості персоналізованого підходу до лікування СПК [4-5, 13].

Дослідження можливості корекції синдрому подразненого кишечника за допомогою фармабіотиків є актуальним через високу поширеність СПК, його значний вплив на якість життя пацієнтів та обмежену ефективність традиційних методів лікування. Використання фармабіотиків як інноваційного підходу, з урахуванням важливості персоналізованої терапії, відкриває перспективи для більш точного та ефективного відновлення балансу кишкового мікробіому [14, 15]. Тому, метою наших досліджень було оцінити ефективність застосування фармабіотиків для корекції симптомів СПК та покращення якості життя пацієнтів через відновлення балансу кишкової мікробіоти.

Методологія та методи дослідження. Дослідження проведені із дотриманням основних положень GCP (1996) Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1997), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2008) і наказу МОЗ України № 960 від 23.09.2009 року.

У дослідження були включені 100 пацієнтів з СПК в анамнезі, які звернулися до лабораторії «Едієнс»

з метою оцінки стану мікробіоти кишечника. Вік обстежених пацієнтів коливався від 18 до 82 років, і в середньому становив $54,6 \pm 5,34$ років.

Мікробіологічні дослідження проводились на базі Науково-дослідницького та навчального Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ «УжНУ». Для виділення та ідентифікації мікроорганізмів зразки випорожнення кишечника, розведені у MRS бульйоні після серійних розведень (10^2 , 10^4 , 10^6 , 10^8 , 10^{10}) висівали по 10 мкл кожного розведення на різні поживні середовища. В роботі були використані наступні селективні та хромогенні середовища: Mitis Salivarius Agar, Bile Esculin Agar, Mannitol Salt Agar, Endo Agar, Bismuth Sulphite Agar, HiCrome Clostridial Agar, Sabouraud Dextrose Agar, Lactobacillus MRS Agar, Bifidobacterium Agar, (виробник HiMedia Laboratories, Індія), Chromatic™ Detection (виробник Liofilchem, Італія). Чашки інкубували при 37°C протягом 24–48 год та підраховували кількість колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів. Мікроскопію нативних мазків проводили з використанням методу Грама [16]. Ідентифікацію ізолюваних мікроорганізмів здійснювали за допомогою біохімічних тест систем ANAERO-23, ENTERO-24, NEFERM-test, Candida-23, STAPHY-16, STREPTO test 24 (виробник LACHEMA, Брно, Чеська республіка).

Для підтвердження (уточненої) ідентифікації використовували метод мас-спектрометрії МАЛДІ (матрично-активована лазерна десорбція/іонізація). Метод полягає в дії імпульсів лазерного випромінювання на матрицю з аналізованим зразком [17]. Для ідентифікації мікроорганізмів використовували свіжі чисті культури (24–48 год інкубації). Для приготування матричного розчину готували насичений розчин б-НССА в 50% ацетонітрилі (АН), 2,5% трифлуоро-ацетної кислоти. Кристали б-НССА поміщали в 200–500 мкл базового розчинника. Для повного розчинення суміш перемішували на вортексі декілька хвилин при кімнатній температурі. Приготований матричний розчин зберігали не більше одного тижня при температурі 4°C . Базовий розчинник складався з 50% ацетонітрилу та 2,5% три-флуороацетної кислоти. Зчитування та аналіз зразків був повністю автоматизованим. Після завантаження металеві пластини з взірцями створювали вакуумні умови всередині камери затримуючи увімкнення аналізатора від 2 до 5 хв. Результати видавалися в цифровому форматі.

Для корекції мікробіоти при СПК застосовували персоналізований підбір фармабіотиків із шести перспективних штамів лактобактерій: *Lactobacillus bulgaricus* S6, *L. delbrueckii subsp. bulgaricus* S19, *L. rhamnosus* S25, *L. plantarum* A, *L. bulgaricus* A6 та *L. bulgaricus* A 22 [18, 19]. Штами мікроорганізмів знаходяться в авторській колекції кафедри біотехнології Університету харчових технологій (University of Food Technology, Plovdiv) та люб'язно надані проф. Альбертом Крастановим. Всі штами мають сертифікат відповідності Selur Pharma Ltd., Bulgaria. Дослідження проводили *in vitro*.

Композицію типових мікроорганізмів для СПК підбирали, враховуючи дані літератури та аналізуючи

результати власних досліджень стану мікробіоти пацієнтів з СПК [14, 20–21].

Персоналізований підбір фармабіотиків проводили шляхом спільного культивування мікроорганізмів, ізолюваних з випорожнення кишечника пацієнтів, та досліджуваних фармабіотиків [22]. Ефективними вважали ті, які проявляли антагоністичну дію по відношенню до етіологічно значимих умовно-патогенних мікроорганізмів, концентрації, яких були за межами норми, та не впливали на ріст представників коменсальної мікробіоти. Оцінка результатів дослідження, математичний аналіз та перевірка достовірності результатів здійснювалися на основі програмного забезпечення Statistica (STATISTICA) та Microsoft Office Excel 2019 (Microsoft Office).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ідентифікацію ізолюваних бактерій проводили за допомогою напівавтоматичних біохімічних тест-систем PLIVA-Lachema (Чеська Республіка). Для підтвердження та уточнення результатів використовували метод мас-спектрометрії MALDI-TOF. Згідно анамнезу пацієнтів, які було надано ними особисто, відомо, що їх турбував рецидивний біль в животі щонайменше 1 день на тиждень протягом останніх 3 місяців, асоційований з двома і більше симптомами пов'язаними із дефекацією – зміна частоти та консистентції випорожнень. Усі пацієнти також скаржилися на порушення психоемоційного стану (тривожність, порушення сну, надмірна збудливість тощо). Згідно з діагностичними Римськими критеріями IV пацієнтам був поставлений діагноз СПК та визначений його підтип (рис. 1). Як зазначено на діаграмі найбільш поширеним підтипом СПК є СПК-Д, який був представлений у 61% хворих. СПК-3 та СПК-3м поширені значно рідше – у 22% та 17% хворих, відповідно.

Середній вік пацієнтів із СПК-3 становив 52 роки, із СПК-Д – 48 років, а із СПК-3м – 60 років (рис. 2). У всіх представлених підтипах СПК більшість пацієнтів складала жінки. Слід відмітити, що із 22 пацієнтів з СПК-3 15 були жіночої статі, що становить 68%. При СПК-Д відсоток жінок із даним підтипом складав 72% (44 із 61), а при СПК-3м даний відсоток становив 82% (14 із 17). Аналізуючи отримані дані, можна вважати, що дані підтипи СПК зустрічаються переважно жінок, а середній вік пацієнтів варіює залежно від підтипу, з тенденцією до збільшення віку у випадку СПК-3м.

Кишкова мікробіота при СПК-3 представлена імуномодулюючими (*Escherichia coli* lac+ (100%)), лактатутворюючими (*Enterococcus faecalis* (100%), *Lactobacillus spp.* (100%), зокрема *L. brevis*, *L. plantarum* та *Bifidobacterium dentium* (100%)) мікроорганізмами. Серед інших бактерій при СПК-3 встановлено присутність умовно-патогенних *Staphylococcus aureus* – 50% та *Actinomyces israelii* – 25%. Частота виділення дріжджоподібних *Candida albicans* становила 75% (рис. 3).

Варто зазначити, що мікробіота кишечника пацієнтів із СПК-3 характеризується переважанням грам-позитивних мікроорганізмів різних форм, що продукують метаболіти, які впливають на скорочення гладких м'язів кишечника, посилюючи симптоми закрепів [23, 24].




Рис. 1. Поширеність різних підтипів СПК, %

Примітка. СПК-3 – синдром подразненого кишечника із закрепом, СПК-Д – синдром подразненого кишечника із діареєю, СПК-3м – синдром подразненого кишечника із закрепами та діареєю




Рис. 2. Розподіл підтипів синдрому подразненого кишечника за віком і статтю

Примітка. СПК-3 – синдром подразненого кишечника із закрепом, СПК-Д – синдром подразненого кишечника із діареєю, СПК-3м – синдром подразненого кишечника із закрепами та діареєю.

Також виявлено підвищений рівень дріжджеподібних грибів та актиноміцетів.

Нами встановлено, що мікробіота кишечника при СПК-Д була представлена імуномодулюючими мікроорганізмами (*Escherichia coli* lac+), лактатутворюючими (*E. faecalis*, *Lactobacillus spp.* (зокрема *L. brevis*, *L. paracasei*) частота виділення, яких становила 100%, *Bifidobacterium spp.* (частота виділення 85%)). У 65% випадків синдрому подразненого кишечника діарейного типу були виявлені облигатні анаероби *Clostridium difficile*. Необхідно відмітити 100% присутність LPS-бактерій, серед яких переважали *Klebsiella oxytoca* (75%), *Citrobacter freundii* (50%), *Serratia marcescens* (50%). (рис. 4).

Мікробіота кишечника у пацієнтів із СПК-Д характеризується домінуванням грамнегативних мікроорганізмів. Грамнегативні бактерії мають ліпополісахариди (ЛПС) у складі клітинної стінки, які є потужними ендотоксинами. *K. oxytoca* конкурує з коменсальними бактеріями кишкової мікробіоти, що порушує гомеостаз і підсилює симптоми діареї. Крім того, підвищений рівень *K. oxytoca* посилює діарею через ушкодження слизової оболонки, внаслідок чого активується секреція хлоридів та натрію у просвіт кишечника, що сприяє накопиченню рідини [25]. Водночас їх метаболіти, зокрема аміни, можуть подразнювати нервові закінчення, викликаючи спазми.

Склад мікробіоти кишечника при змішаному СПК був представлений імуномодулюючими мікроорганізмами (*E. coli* lac+ (ч.в. 100%)), лактатпродукуючими (як *E. faecalis* (частота виділення становила 100%), *Lactobacillus spp.* (*L. casei*, *L. plantarum*) (ч.в. 100%), *Bifidobacterium spp.* (*B. bifidum*, *B. dentium*) (ч.в. 85%)), LPS-бактеріями (ч.в. 100%) (зокрема *E. coli*, lac- (ч.в.




Рис. 3. Частота виділення мікроорганізмів при синдромі подразненого кишечника із закрепом, %




Рис. 4. Частота виділення мікроорганізмів при синдромі подразненого кишечника із діареєю, %

33%), *Enterobacter cloacae* (ч.в. 33%), *Proteus vulgaris* (ч.в. 33%). Слід також відмітити ріст мікроскопічних грибів *C. albicans* (ч.в. 35%) (рис. 5).

Мікробіота кишечника пацієнтів із змішаним типом синдрому подразненого кишечника (СПК-3м) харак-

теризується гетерогенністю, поєднуючи ознаки як діарейної, так і форми із закрепом захворювання. Окрім домінування імуномодулюючих та лактоутворюючих бактерій, характерних для здорової мікробіоти, у пацієнтів із СПК-3м виявляється значне збільшення




Рис. 5. Частота виділення мікроорганізмів при синдромі подразненого кишечника змішаного типу, %

кількості бактерій, що продукують ліпополісахариди (ЛПС), та мікроскопічні гриби.

В нашій роботі досліджено ефективність фармабіотиків для модуляції кишкової мікробіоти при різних підтипах СПК, що дозволить покращити моторику кишечника та полегшити симптоми (табл. 1).

Таблиця 1

Комбінація ефективних фармабіотиків при різних підтипах СПК

№ з/п	Підтипи СПК	Комбінація фармабіотиків
1	СПК-З	<i>L. bulgaricus S6</i> та <i>L. rhamnosus S25</i>
2	СПК-Д	<i>L. bulgaricus A6</i> та <i>L. bulgaricus S6</i>
3	СПК-Зм	<i>L. bulgaricus A22</i> та <i>L. rhamnosus S25</i>

Примітка. СПК-З – синдром подразненого кишечника із закрепом, СПК-Д – синдром подразненого кишечника із діареєю, СПК-Зм – синдром подразненого кишечника із закрепами та діареєю.

Результати досліджень продемонстрували відмінності у ефективності досліджуваних штамів пробіотиків при СПК. Штами *L. bulgaricus S6* та *L. rhamnosus S25* виявили селективну активність щодо зниження чисельності *E. faecalis*, *A. israelii* та *C. albicans* у пацієнтів із СПК-З. Натомість, комбінація штамів *L. bulgaricus A6* та *L. bulgaricus S6* продемонструвала здатність модулювати мікробіоту кишечника при СПК-Д, проявляючи антагоністичну активність відносно умовно-патогенних ентеробактерій. При змішаному типі синдрому подразненого кишечника ефективною виявилася комбінація пробіотичних штамів *L. bulgaricus A22* та *L. rhamnosus S25*, яка

продемонструвала антагоністичну активність відносно умовно-патогенних ентеробактерій та мікроскопічних грибів.

Отримані результати свідчать про ефективність корекції мікробіому кишечника фармабіотиками *L. bulgaricus S6*, *L. bulgaricus A6*, *L. bulgaricus A22* та *L. rhamnosus S25*. Важливо зазначити, що ці штами не лише пригнічують патогенні мікроорганізми, але й сприяють збереженню “корисних” бактерій.

Висновки з дослідження.

1. Найпоширенішим підтипом синдрому подразненого кишечника (СПК) є СПК-Д (діарейний тип), який виявлявся у 61% досліджуваних пацієнтів.

2. Проведений аналіз показав, що СПК частіше зустрічається у жінок. Середній вік пацієнтів варіювався залежно від підтипу СПК, причому при СПК-Зм (змішаному типі) спостерігалася тенденція до його збільшення.

3. Встановлено суттєву різницю у домінуванні різних мікроорганізмів при СПК-З, СПК-Д, СПК-Зм.

4. Показано, що при корекції кишкової мікробіоти при різних підтипах СПК необхідно застосовувати індивідуальний підхід. При СПК-З ефективною є композиція з фармабіотиків *L. bulgaricus S6* та *L. rhamnosus S25* в той час як при СПК-Д – *L. bulgaricus A6* та *L. bulgaricus S6*, а СПК-Зм – *L. bulgaricus A22* та *L. rhamnosus S25*.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Персоналізований підхід до підбору біопрепаратів, зокрема із застосуванням методу антагонізму, є перспективним напрямом досліджень мікробіоти кишечника. Такий підхід може стати основою для розробки індивідуальних стратегій профілактики та терапії патологічних станів, пов'язаних із порушеннями мікробного складу кишечника.

Оптимізація персоналізованих підходів до лікування СПК має потенціал суттєво підвищити ефективність терапії, а також покращити якість життя пацієнтів. Для цього необхідно розробити стан-

дартизовані протоколи, алгоритми та рекомендації, які базуватимуться на результатах подальших фундаментальних та прикладних досліджень у цій галузі.

REFERENCES

1. Kamiya T, Shikano M. Definition of Irritable Bowel Syndrome. *Irritable Bowel Syndrome* [Internet]. 2024;3–11. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-97-8410-3_1
2. Waluga M. Biomarkers of irritable bowel syndrome. *A Comprehensive Overview of Irritable Bowel Syndrome* [Internet]. 2020;107–27. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-821324-7.00009-5>
3. Zhao, Y., Zhu, S., Dong, Y., Xie, T., Chai, Z., Gao, X., Dai, Y., & Wang, X. The Role of Gut Microbiome in Irritable Bowel Syndrome: Implications for Clinical Therapeutics. *Biomolecules*, 2024;14(12):1643. Available from: <https://doi.org/10.3390/biom14121643>
4. Understanding the Gut Microbiome: Implications for Health and Disease. *JMHSR* [Internet]. 2023 Jun. 30 [cited 2024 Dec. 23];1(1):20-33. Available from: <https://jmhsr.com/index.php/jmhsr/article/view/27>
5. The Microbiome and Its Role in Human Health: Exploring the Complex Interactions Between Gut Bacteria and Various Diseases. (2023). *Journal of Medical & Health Sciences Review*, 1(1):1-10. Available from: <https://jmhsr.com/index.php/jmhsr/article/view/25>
6. Sienkiewicz M. Diet in irritable bowel syndrome. *A Comprehensive Overview of Irritable Bowel Syndrome* [Internet]. 2020;183–204. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-821324-7.00013-7>
7. Burmei SA, Boyko NV. Key aspects of the use of new generation probiotic strains in 3P medicine: challenges and prospects. *Intermedical journal* [Internet]. 2024 May 31;(1):28–36. Available from: <http://dx.doi.org/10.32782/2786-7684/2024-1-5>
8. Britton RA, Hoffmann DE, Khoruts A. Probiotics and the Microbiome—How Can We Help Patients Make Sense of Probiotics? *Gastroenterology* [Internet]. 2021 Jan;160(2):614–23. Available from: <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2020.11.047>
9. D’Mello C, Swain MG. The gut–liver–brain axis: dietary and therapeutic interventions. *The Complex Interplay Between Gut-Brain, Gut-Liver, and Liver-Brain Axes* [Internet]. 2021;205–36. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-821927-0.00007-3>
10. Matyash LA. Efficacy of the use of the synbiotic Maxibalance in the complex therapy of the small intestine bacterial overgrowth syndrome in patients with irritable bowel syndrome with diarrhea. *Medicine of Ukraine* [Internet]. 2023 Feb 13;(1(267)):19–24. Available from: [http://dx.doi.org/10.37987/1997-9894.2023.1\(267\).281401](http://dx.doi.org/10.37987/1997-9894.2023.1(267).281401)
11. Sharma S, Kumar S, Sajjad S, Sharma S. Probiotics in Irritable Bowel Syndrome: A Review Article. *Cureus* [Internet]. 2023 Mar 23; Available from: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.36565>
12. Anwer R, AlQumaizi K, Halim A, Halim K, AlOsaimi S. Irritable bowel syndrome: The role of probiotics in the systematic and successful treatment of irritable bowel syndrome. *Imam Journal of Applied Sciences* [Internet]. 2017;2(1):8. Available from: http://dx.doi.org/10.4103/ijas.ijas_2_18
13. Boyko N, Costigliola V, Golubnitschaja O. Microbiome in the Framework of Predictive, Preventive and Personalised Medicine. *Microbiome in 3P Medicine Strategies* [Internet]. 2023;1–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-19564-8_1
14. GAOUAR SBS. The Gut Microbiome and Human Health: Insights from Recent Research. *Genet. Biodiv. J* [Internet]. 2025 Jan. 13 [cited 2025 Jan. 25];9(1). Available from: <https://journals.univ-tlemcen.dz/GABJ/index.php/GABJ/article/view/431>
15. Menees S, Chey W. The gut microbiome and irritable bowel syndrome. *F1000Research* [Internet]. 2018 Jul 9;7:1029. Available from: <http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.14592.1>
16. Ivashko M, Burmei S, Yusko L, Chaikovska T, Boyko N. Microbiological diagnostics: From traditional to molecular genetic methods: A literature review. *Bulletin Of Medical And Biological Research* [Internet]. 2023 Oct 16;5(4):34–41. Available from: <http://dx.doi.org/10.61751/bmbr/4.2023.34>
17. Shah HN, Gharbia SE, editors. *MALDI-TOF and Tandem MS for Clinical Microbiology*. 2017 Apr 7; Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/9781118960226>
18. Denkova R, Ilieva S, Denkova Z, Georgieva L, Krastanov A. Examination of the technological properties of newly isolated strains of the genus *Lactobacillus* and possibilities for their application in the composition of starters. *Biotechnology & Biotechnological Equipment* [Internet]. 2014 May 4;28(3):487–94. Available from: <http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2014.918701>;
19. Denkova Z, Krastanov A. Development of New Products: Probiotics and Probiotic Foods. *Probiotics* [Internet]. 2012 Oct 3; Available from: <http://dx.doi.org/10.5772/47827>
20. Study of microbiome aberrations in patients with irritable bowel syndrome with diarrhea by next-generation sequencing. *RESEARCH RESULTS IN BIOMEDICINE* [Internet]. 2023 Dec 29;9(4). Available from: <http://dx.doi.org/10.18413/2658-6533-2023-9-4-0-2>
21. The Microbiome and Irritable Bowel Syndrome: An Emerging Hope for Treatment. *Gastroenterology Nursing* [Internet]. 2024 May;47(3):E2–3. Available from: <http://dx.doi.org/10.1097/sga.0000000000000825>
22. Yusko LS, Burmei SA, Lemko IS, Krastanov AI, Boyko NV. The Use of Personalized Pharmabiotics as an Approach to the Rehabilitation of Post-COVID Patients. *Mikrobiolohichniy Zhurnal* [Internet]. 2024 Sep 3;86(4):64–75. Available from: <http://dx.doi.org/10.15407/microbiolj86.04.064>

-
23. Tian H, Chen Q, Yang B, Qin H, Li N. Analysis of Gut Microbiome and Metabolite Characteristics in Patients with Slow Transit Constipation. *Digestive Diseases and Sciences* [Internet]. 2020 Aug 7;66(9):3026–35. Available from: <http://dx.doi.org/10.1007/s10620-020-06500-2>
 24. Chen Y, Wang Z, Chen X, Chao G, Zhang S. The role of gut microbiota and metabolites in regulating the immune response in drug-induced enteritis. *Journal of Applied Microbiology* [Internet]. 2023 Feb 20;134(3). Available from: <http://dx.doi.org/10.1093/jambio/lxad032>
 25. Guțu N. Conditionally pathogenic agents of the family Enterobacteriaceae (Klebsiella and Enterobacter) causing acute diarrhea diseases. *Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova Life Sciences* [Internet]. 2023 Mar;(3(347)):94–100. Available from: <http://dx.doi.org/10.52388/1857-064x.2022.3.11>